

## Notfälle in der Frühschwangerschaft

### Erstes Trimenon

Das erste Drittel wird als die kritischste Zeit einer Schwangerschaft angesehen. In dieser Phase ereignet sich die Mehrzahl der Fehlgeburten.

### Abort (Fehlgeburt)

- 20% der Schwangerschaften im ersten Trimenon (Inzidenz steigt mit zunehmendem Alter der Mutter)
- Ursache ist häufig eine Chromosomenanomalie
- Leitsymptome vaginale Blutungen und Unterleibsschmerzen können auch fehlen oder fälschlicherweise als Menstruationsblutung gedeutet werden

### EUG (Extrauterine Gravidität)

- Einnistung der befruchteten Eizelle ausserhalb des Uterus, in 95% im Eileiter
- 2% aller Schwangerschaften sind eine EUG
- Symptome treten häufig in der 6.-8. Schwangerschaftswoche auf
- Leitsymptome vaginale Blutungen und Unterleibsschmerzen
- Lebensbedrohlich Komplikationen möglich bei Ruptur des Eileiters (intraabdominale Blutung)

### Therapiemöglichkeiten

#### Abort

- exspektativ (abwartendes Vorgehen)
- medikamentös
- operativ

#### EUG

- Medikamentös
- Laparoskopie



### Triage

- Welche Schwangerschaftswoche?
- Wie stark sind die vaginalen Blutungen?
- Hat die Patientin Schmerzen?
- Vitalzeichen erfassen
- Temperatur messen
- Ist eine Blutgruppenkarte vorhanden?

Quelle: Fasttrack, Folge 28

Autorin: Karin Ciapponi

[www.fasttrack-notfall.com](http://www.fasttrack-notfall.com)

