

Notfälle in der Frühschwangerschaft

Erstes Trimenon

Die ersten 12. Wochen einer Schwangerschaft bezeichnet man als erstes Trimenon. Diese ersten 12 Wochen sind die kritischste Zeit jeder Schwangerschaft, denn in dieser Phase ereignet sich die Mehrzahl der Fehlgeburten.

Abort (Fehlgeburt)

- 20% der Schwangerschaften im ersten Trimenon (Inzidenz steigt mit zunehmendem Alter der Mutter)
- Ursache ist häufig eine Chromosomenanomalie
- Leitsymptome vaginale Blutungen und Unterleibsschmerzen können auch fehlen oder fälschlicherweise als Menstruationsblutung gedeutet werden

EUG (Extrauterine Gravidität)

- Einnistung der befruchteten Eizelle ausserhalb des Uterus, in 95% im Eileiter
- 2% aller Schwangerschaften ist eine EUG
- Häufig in der 6.-8. Woche
- Leitsymptome vaginale Blutungen und Unterleibsschmerzen
- Lebensbedrohlich Komplikationen möglich, bei Ruptur des Eileiters (intraabdominale Blutung)

Therapiemöglichkeiten

Abort

- exspektativ (abwartendes Vorgehen)
- medikamentös
- operativ

EUG

- Medikamentös (niedrig dosiertes Chemotherapeutikum)
- Laparoskopie (Ausschälung oder Entfernung des Eileiters)



Triage

- Welche Schwangerschaftswoche?
- Wie stark sind die vaginalen Blutungen?
- Hat die Patientin Schmerzen?
- Vitalzeichen erfassen
- Temperatur messen
- Ist eine Blutgruppenkarte vorhanden?

Quelle: Fasttrack, Folge 28

Autorin: Karin Ciapponi

www.fasttrack-notfall.com

